



**FOR VETERINARY USE ONLY  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
DIN 00349704

**INDICATIONS:**

As an antiseptic for topical use, a counter-irritant in chronic inflammatory conditions and as a parasiticide in ringworm. May be used as a pre- and post-operative dressing.

**ACTIVE INGREDIENTS:**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Iodine .....            | 7.0% w/v |
| Potassium Iodide .....  | 5.0% w/v |
| Isopropyl Alcohol ..... | q.s.     |

**DANGER-FLAMMABLE:**

Keep tightly closed when not in use. Store in a cool place.

**DIRECTIONS:**

For superficial cuts, abrasions, insect bites or bruises, cleanse with soap and water, apply lightly not more than once daily. If repeated, dilute with 3 volumes of water. Do not bandage.

**CAUTION:**

If redness, irritation or swelling persists or increases, discontinue use. Avoid contact with eyes and mucous membranes. Not for burns, deep wounds or body cavities.

**POISON ANTIDOTE:**

Thin starch or flour water paste. To vomit take mustard and warm water. Call a physician at once.

**NET CONTENTS / CONTENU NET: 500ML**

**DOMINION VETERINARY LABORATORIES LTD.**

1199 Sanford St., Winnipeg, Manitoba, Canada R3E 3A1  
**www.domvet.com 1-800-465-7122**



**POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT  
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**  
DIN 00349704

**INDICATIONS:**

Cette solution peut être servit comme antiseptique pour blessures superficiels, comme révéulsif des conditions inflammatoires chronique et comme parasiticide pour teignes. Peut être servit aussi comme pansement avant et après une operation.

**INGRÉDIENTS ACTIF:**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Iode .....                 | 7.0% w/v |
| Iode de potassium .....    | 5.0% w/v |
| Alcool Isopropylique ..... | q.s.     |

**DANGER-INFLAMMABLE:**

Fermez bien quand il n'est pas utilisé. Garder dans une endroit fraiche.

**MODE D'EMPLOI:**

Pour coupures superficiels, égratignures, piqûres d'insect ou meurtrissures, nettoyez avec de l'eau et savon; appliqué légèrement pas plus qu'un fois par jour. Dilué avec 3 fois le volume d'eau s'il faut répéter. Ne couvrez pas avec un pansement.

**ATTENTION:**

Si la condition continue ou empire, arrêtez l'usage. Évitez contact avec les yeux et membranes mucus. N'utilisez pas sur des coupures creuses ou sur des brûlures sérieuses.

**POISON ANTIDOTE:**

Une mince pâte de farine ou d'amidon avec de l'eau. Pour vomir, prenez de la moutarde avec de l'eau chaude. Appeler un médecin immédiatement.



**DOMINION VETERINARY LABORATORIES LTD.**

1199 Sanford St., Winnipeg, Manitoba, Canada R3E 3A1  
**www.domvet.com 1-800-465-7122**